

「三角関数と極形式」

複素数の和, 差 (加法, 減法) は複素平面のベクトルとしての和, 差を用いて図形的に理解できた. 積, 商 (乗法, 除法) の図形的な理解は直感的には容易ではない. 複素数の積 $\alpha\beta$, 逆数 $\frac{1}{\alpha}$, 商 $\frac{\alpha}{\beta}$, さらにべき乗 $\alpha^2, \alpha^3, \sqrt{\alpha}$ らを図形的に理解するには, 三角関数を用いた極形式が役に立つ.

目標: $z = x + yi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ であり, もう一つの $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$ に対して,

$$zz' = rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')) \text{ となる.}$$

教科書の関連項目: 数学 I: 三角比. 数学 II: 三角関数. 数学 III: 複素数平面, 式と曲線 (極座標) など.

(a) 一般角と弧度法, ラジアン, 三角関数

角度の単位

度数法: $45^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 360^\circ$ (度)

弧度法: 半径 1 の円を考える. $\angle AOB$ が切り取る円弧の長さが 1 のとき $\angle AOB$ の大きさを

1 ラジアンといい, これを単位として角の大きさを測る方法を弧度法という.

一周分の角度 $360^\circ = 2\pi$ ラジアン

半周分の角度 $180^\circ = \pi$ ラジアン

直角 $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ ラジアン

一周分, 半周分, 直角に対する割合で表示している.

$$1 \text{ ラジアン} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ$$

問 a. 度数法を用いて表された以下の角度を弧度法を用いて表してみよう.

(1) $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ ラジアン.

(2) 30°

(3) 60° 三角関数： $\cos \theta$ 余弦関数, $\sin \theta$ 正弦関数(1) $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ($= 90^\circ$), または $\leq \pi$ ($= 180^\circ$) のとき.図の直角三角形において $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\sin \theta = \frac{y}{r}$.

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

(2) $0 \leq \theta \leq 2\pi$ のとき. $\frac{2}{3}\pi = 120^\circ$ のとき $\cos \theta$, $\sin \theta$ を求めてみよう.(3) $\theta > 2\pi$ のとき.

$$\frac{9}{4}\pi = \frac{\pi}{4} + 2\pi, \quad \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(4) $\theta < 0$ のとき.

$$-\frac{\pi}{6} = -30^\circ. \quad \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

 $-\frac{\pi}{6} = -30^\circ$ は, x 軸の $x > 0$ の部分から時計回りに $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$ と考える.**(b) 極形式, 絶対値, 偏角**(0 でない) 複素数 $z = x + yi$ が表す点を P とする.O からの距離を $r = |OP|$, x 軸 (の $x > 0$ の部分) から反時計回りの角度を θ とする.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}$$

となる. よって $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$(\#) \quad z = x + yi = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

と表される. これを複素数 z の極形式という. $r = |OP|$ を z の大きさ, または絶対値といい, $|z|$ で表わす.角度 θ を z の偏角といい, $\arg z$ で表わす. 偏角: argument. 角度: angle.

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arg z.$$

(注意: x 軸から時計回りに $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$ は, x 軸から反時計回りに $-\frac{\pi}{6} = -30^\circ$ と考える.)

問 b. 次の複素数を極形式で表してみよう. 作図により求めてもよい.

$$(1) z = 1 + i. \quad |z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \quad z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$(2) z = \sqrt{3} + i.$$

$$(3) z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i. \quad |z| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1, \quad \theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ, \quad z = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}.$$

$$(4) z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i. \quad |z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1, \quad \theta = \frac{2}{3}\pi = 120^\circ, \quad z = \cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi.$$

$$(5) z = \sqrt{3} - i. \quad |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2, \quad \theta = -\frac{\pi}{6}, \quad z = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right).$$

共役な複素数 \bar{z} の極形式.

$z = x + yi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ のとき,

$$\bar{z} = x - yi = r(\cos \theta - i \sin \theta) = r(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)).$$

問 b の (2) $z = \sqrt{3} + i$ と (5) $z = \sqrt{3} - i$ は互いに共役な複素数である.

(c) 複素数の積と三角関数の加法定理

複素数の積. 二つの複素数 $z_1 = x_1 + y_1i, z_2 = x_2 + y_2i$ に対して

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (y_1 x_2 + x_1 y_2) i$$

であった. これを極形式を用いて表してみる.

$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ とすると, 上式は

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 ((\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2))$$

となる. ここで次の三角関数の加法定理を用いる:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

すると, 積 $z_1 z_2$ の極形式は

$$(*) \quad z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

となる. 従って

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

となり, 複素数の積は, 絶対値 $r = |z|$ の積と偏角 $\theta = \arg z$ の和に対応することが分かる.

問 c. (1) $z = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$ のとき. $z^2 = \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \frac{\pi}{2} = 0 + 1 \cdot i = i.$

(2) $z_1 = \sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right), z_2 = 1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ のとき.

$z_1 =$ 問 b(2) の $z, z_2 =$ 問 b(3) の z の 2 倍. $z_1 z_2 = 2^2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 4i.$

(3) $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ だから, iz は z を $\frac{\pi}{2}$ 回転した点 (複素数) を表わす.

複素数の逆数, 商.

$$\frac{1}{z} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ であつた. } \bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta), |z| = r \text{ より}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{r(\cos \theta - i \sin \theta)}{r^2} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) \text{ が成り立つ.}$$

$z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ に対して

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot \frac{1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

となる. 従って

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

つまり, 複素数の商は, 絶対値 $r = |z|$ の商と偏角 $\theta = \arg z$ の差に対応する.

(d) z^n の様子

大きさ $|z| = 1$ の複素数 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ に対して,

(c) の積の公式 $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$ より,

$$z^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta,$$

$$z^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta,$$

...

$$z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

をえる. つまり

$$(b) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

が成り立つ. これをド・モアブルの定理という. 上では n は自然数として考えたが, 逆数をとればわかるように, n は負の整数としても成立する.

一般の $z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$ に対しては

$$(b) \quad z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

となる.

問 d. (1) $z = \cos \pi + i \sin \pi = -1$, $z^2 = (-1) \times (-1) = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$.

(2) $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi$ (問 b(4)) に対し,

$$\omega^2 = \cos \frac{4}{3}\pi + i \sin \frac{4}{3}\pi = \bar{\omega}, \quad \omega^3 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1.$$

(3) 問 b(3) の極形式を利用して $(1 + \sqrt{3}i)^6$ を求めてみよう.

(e) 複素数のべき根

与えられて複素数 α に対して, $z^2 = \alpha$ となる複素数 z を α の平方根という. 2次方程式 $z^2 = \alpha$ の一つの (複素数) 解を z_1 とすれば, $z^2 = \alpha = z_1^2$ より $(z/z_1)^2 = 1$, $z/z_1 = \pm 1$ をえる. よって $z = \pm z_1$ がすべての解になる.

$\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ のとき, $z_1 = \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$ は $z_1^2 = r \left(\cos 2 \frac{\theta}{2} + i \sin 2 \frac{\theta}{2} \right) = \alpha$ をみたす. この z_1 を $\sqrt{\alpha}$ と書くことに約束すると, 他の解は $-\sqrt{\alpha}$ になる.

$z^3 = \alpha$ となる複素数 z を α の 3乗根という. 3次方程式 $z^3 = \alpha$ の一つの解を z_1 とすれば, $z^3 = \alpha = z_1^3$ より $(z/z_1)^3 = 1$, $z/z_1 = 1, \omega, \omega^2$ をえる. ここで $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ (問 d(2)) である. よって $z = z_1, \omega z_1, \omega^2 z_1$ がすべての解になる. $z_1 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right)$ と取れる.

問 e. 次の方程式の解を求めてみよう. 作図により求めてもよい.

$$(1) z^2 = 1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \text{ の解は, } z = \pm \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \pm \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right).$$

$$(2) z^2 = \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}. \quad (3) z^3 = i.$$

一般に $x^n = \alpha$ となる複素数 z は α の n 乗根 (べき根) とよぶ. これを求めるために, $\alpha = \rho(\cos \beta + i \sin \beta)$, $x = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ とおけば, ド・モアブルの公式から,

$$x^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) = \rho(\cos \beta + i \sin \beta)$$

となるから,

$$r^n = \rho, \quad n\theta = \beta + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

従って

$$x = \sqrt[n]{|\alpha|} \left(\cos \frac{2k\pi + \beta}{n} + i \sin \frac{2k\pi + \beta}{n} \right), \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

であるが, これらのうち相異なるのは n 個で, たとえば $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ で与えられる. これらは半径 $\sqrt[n]{|\alpha|}$ の円周を n 等分する点になる. とくに 1 の n 乗根は $\omega = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$ とおくと, $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ である.

(f) オイラー (Euler) の公式

以下の公式が成り立つ:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

たとえば, $e^{\pi i} = -1$. これを使えば, $z = |z|e^{i\theta}$, $\theta = \arg z$ と表される. ド・モアブルの定理は $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ という指数法則に他ならないことがわかる.